



آموزش به بیمار



مراقبت های بعد از جا اندازی بینی در کودکان

- * بر اساس منابع علمی معتبر ، میزان موفقیت عمل جااندازی بینی حدود ۷۰٪ برآورد شده است.
- * پس از جااندازی ، به مدت یک هفته گچ بینی گذارده می شود . در صورت شل شدن گچ بینی ، جهت محکم کردن گچ ، آنرا فشار ندهید و صرفاً با اضافه کردن چسب از افتادن گچ جلوگیری کنید.
- * در صورت وجود مش بینی بسته به صلاحدید پزشک خود برای زمان خروج آن به اورژانس مراجعه نمایید.
- * برای برداشتن گچ بینی جهت ویزیت مجدد ۷روز بعد از عمل جراحی با خلاصه پرونده به اورژانس بیمارستان مراجعه نمایید(تاریخ مراجعه بعدی به شما داده می شود).
- * بعد از برداشتن گچ بینی ، در صورتی که در استخوانهای بینی خود انحرافی ملاحظه کردید ، به پزشک خود اطلاع دهید
- * بعد از برداشتن گچ بینی ، از زدن عینک ، ورزشهای سنگین و خوابیدن روی پهلو یا شکم ، به مدت یک ماه اجتناب شود.
- * بعد از جراحی نیازی به تجویز داروی خاصی نیست ، فقط در بیمارانی که در آنها "مش بینی" تعبیه شده است ، در صورت دستور پزشک مبنی بر دریافت آنتی بیوتیک طبق دستور مصرف گردد.
- * در صورت بروز هر گونه مشکل خاص (مثلاً خونریزی ، تورم بینی ، تب) اورژانس بیمارستان امیراعلم به صورت شبانه روزی در خدمت شماست.



آموزش سلامت بیمارستان امیر اعلم