



تجمیعیارستانی امیرعلم

Amiralam.tums.ac.ir

آموزش به بیمار

از هپاتیت B چه می دانید؟




در صورت مراجعه به دندانپزشک، آزمایشگاه، پزشک و اصولاً هر جای دیگری که احتمال انتقال ویروس از شما به دیگران وجود دارد، حتماً آنها را از مشبت بودن هپاتیت خود آگاه کنید.



هیچگونه محدودیتی در زندگی خود به وجود نیاورید.

تمام اصول بهداشت را رعایت کنید.



کسی است که از نظر آزمایش هپاتیت مشبت بوده و هیچگونه علائم بالینی ندارد.



کلیه اعضای خانواده و هر شخص دیگری که با شما زندگی می کند، بایستی بر علیه هپاتیت واکسینه شوند.



◆ دندانپزشکان و کمک دندانپزشکان که بطور مستقیم با بیمار در تماس هستند.

◆ بیمارانی که به طور مرتب دیالیز می شوند.

◆ افراد خانواده بیمار.

نکاتی که باید در درمان

هیاتیت رعایت نمود

برحسب شدت بیماری استراحت نمایید.

به دلیل عدم تحمل بیمار و امکان تشدید

تهوع و استفراغ ، غذاهای چرب کمتر مصرف شود.

غذا با طبع بیمار تهیه شود.

معاینه و بررسی های آزمایشگاهی با نظر

پزشک معالج انجام گیرد.

◆ انتقال از مادر به جنین و نوزاد.

◆ خالکوبی و حجامت ، سوراخ کردن گوش ، طب سوزنی با روشهای غیر بهداشتی.




◆ تماس جنسی.

◆ از طریق وسایل غیراستریل دندانپزشکی و پزشکی و مخصوصاً سرنگ غیر استریل و مشترک.

◆ در اثر استفاده از لوازم شخصی دیگران مانند تیغ و ریش تراش ، مسواک ، ناخن گیر و...

افراد زیر لازم است علیه هیاتیت واکسینه شوند:

◆ کلیه کادر بهداشتی ، درمانی که با خون و یا سوزن یا سایر وسایل آلوده به ویروس در تماس باشند.



هیاتیت B

به التهاب کبد هیاتیت گفته می شود.



ضعف و بیحالی ، تب ، تهوع ، استفراغ ، اسهال و بی اشتهاای و درد سر دل یا ناحیه راست و بالای شکم ، سینه و پهلو ، ناراحتی کلیه ، درد مفاصل ، بشورات جلدی ، زردی ، کهیر و بزرگی کبد.



◆ استفاده از فرآورده های خونی آلوده.

◆ تماس خون آلوده با چشم ، دهان و پوست

زخمی یا آسیب دیده افراد سالم (آلوده شدن زخمها).