



آنژیوفیبروم

گرداورنده
خانم نورپور

معرفی بیماری

شایع ترین تومور خوش خیم ناحیه نازوفارنکس است.

آنژیوفیبروم کمتر از نیم درصد از تومور های سر و گردن را تشکیل می دهد.

از نظر بافت شناسی حاوی کانال های عروقی متعددی می باشد که این موضوع سبب استعداد به خونریزی شدید هنگام جراحی یا بیوپسی میشود.

آنژیوفیبروم نازوفارنگس معمولا در مردان بروز می کند سنین ۷ تا ۱۹ سالگی شایع ترین احتمال بروز این بیماری می باشد

علائم

گرفتگی بینی

افزایش ترشحات بینی

خونریزی از بینی

انسداد بینی

برجستگی صورت



علت بیماری

دلیل مشخصی ندارد

در اثر اختلالات ژنتیکی به وقوع می پیوندد.

تشخیص بیماری

علائم بالینی

تصاویر رادیولوژیک نظیر سی تی اسکن و گرافی

از بیوپسی قبل از عمل به دلیل احتمال خونریزی شدید اجتناب می شود.

درمان بیماری

آندوسکوپی بینی و سینوس

آمبولیزاسیون قبل از جراحی

در ۵۰٪ موارد آنژیوفیبروم

نازوفارنکس بعد از جراحی

مجددا رشد می کند که می تواند

به دلیل جا ماندن تکه ای از بافت

تومور در ناحیه جراحی باشد که

معمولا بعد از دو سال بروز می

کند.



مراقبت های بعد از جراحی

استراحت

عدم مصرف سیگار به دلیل

التهاب بینی

خودداری از نوشیدن مایعات داغ

و رفتن به حمام اب داغ تا دو

هفته به دلیل پیشگیری از

خونریزی بینی

از انجام فعالیت هایی که باعث

افزایش فشار بر بینی می شود

مانند زور زدن یا فین کردن یا

نگاه به پایین و خم شدن

خودداری کند

