



ممکن است از شما خواسته شود تا چند بار نفس عمیق بکشید و سپس نفستان را حبس کنید تا نمونه برداری با موفقیت انجام شود. در این حال پزشک سوزن را از پوست و فاصله بین دنده ای به سمت کبد شما عبور می دهد و ظرف چند ثانیه تکه کوچکی از کبد شما را نمونه برداری می کند. ممکن است عبور دادن سوزن و نمونه برداری برای ۲-۳ بار تکرار شود تا نمونه کافی بدست آید. سپس محل نمونه برداری بدقت پانسمان می شود. در این کار احتیاجی به بخیه نیست.

بعد از نمونه برداری از کبد:

نمونه کبد بدست آمده در ظرف مخصوص قرار داده شده و برای ارسال به آزمایشگاه آسیب شناسی آماده می شود. شما باید چند ساعت تحت نظر باشید. در این چند ساعت طبق دستور پزشک نباید غذا بخورید و سرم می گیرید. فشار خون و نبض شما مرتب توسط پرستار اندازه گیری می شود.

- ✓ در صورتی که سابقه ابتلا به بیماری های خونی دارید، حتماً پزشک و پرستار را مطلع کنید.
- ✓ در صورتی که آسپرین، بروفن و یا وارفارین مصرف می کنید، یک هفته قبل از نمونه برداری با نظر پزشک مصرف داروها را متوقف کنید، زیرا این داروها احتمال خونریزی حین نمونه برداری را افزایش می دهند.
- ✓ شش ساعت قبل از انجام نمونه برداری از خوردن و آشامیدن پرهیز کنید.

نمونه برداری از کبد چگونه انجام می شود؟

شما روی یک تخت به حالت خوابیده به پشت (طاق باز) می خوابید. قبل از خوابیدن روی تخت حتماً اگر احساس پری مثانه یا روده می کنید به دستشویی بروید، چرا که شما حداقل تا چند ساعت بعد از نمونه برداری باید به پهلو راست روی تخت بخوابید و بهتر است در این مدت از تخت پایین نیایید.

پرستار به شما سرمی را وصل می کند (ترجیحاً دست چپ). در زمان نمونه برداری از کبد در حالیکه به پشت روی تخت (طاق باز) و نزدیک لبه راست تخت خوابیده اید از شما خواسته می شود تا دست راست خود را زیر سر بگذارید. پزشک محل دقیق انجام نمونه برداری از کبد را با سونوگرافی مشخص می کند و علامت می گذارد. بعد از ضد عفونی کردن، ماده بیحس کننده موضعی تزریق می شود.

بیوپسی یا نمونه برداری از کبد چیست؟

در بیوپسی کبد تکه بسیار کوچکی از کبد نمونه برداری می شود و زیر میکروسکوپ توسط متخصص آسیب شناسی بررسی می شود.



با بیوپسی کبد چه نتیجه ای بدست می آید؟

در نمونه برداری از کبد و بررسی روی نمونه کبد جزئیات کاملتری از آنچه در کبد رخ داده است بدست می آید که با انجام سونوگرافی کبد یا سایر آزمایشات و عکسبرداریهای دیگر بدست نمی آید. پزشکان با این روش از شدت و میزان پیشرفت بیماری کبدی نیز مطلع می شوند.

آمادگی قبل از نمونه برداری کبد

- ✓ برای تشخیص اختلالات انعقادی باید آزمایش خون انجام شود. در صورت وجود این نوع مشکلات نمونه برداری انجام نخواهد شد.
- ✓ یک روز قبل از آزمایش حمام کنید و موهای ناحیه شکم را کاملاً برطرف نمایید.
- ✓ در هنگام مراجعه به بیمارستان، نتایج آزمایشات و سونوگرافی شکم را به همراه داشته باشید.




مجمع بیمارستانی امیراعلم

Amiralam.tums.ac.ir

آموزش به بیمار

بیوپسی (نمونه برداری) کبد



بهتر است برای حداقل ۲ ساعت به پهلوئی راست خوابیده باشید.

روی تخت دراز کشیده و از حرکات زیاد خودداری نمایید.

در صورت وجود درد مسکن تجویز خواهد شد.

آیا نمونه برداری از کبد عوارض دارد؟

✓ عارضه شایعتر نمونه برداری از کبد احساس درد در محل ورود سوزن و سمت راست شکم و یا شانه راست است. این احساس درد معمولاً مبهم و خفیف است. درد معمولاً با نفس کشیدن قدری بیشتر می شود و ظرف چند ساعت تا یک روز بعد معمولاً از بین می رود. گاهی اوقات این درد ممکن است بیشتر طول بکشد و بعد از مرخص شدن تا مدت ها درد خفیفی را در محل نمونه برداری داشته باشید. برای کاهش درد می توانید از مسکن خوراکی که پزشک برایتان تجویز کرده استفاده کنید. در صورت درد شدیدتر که به این داروها جواب ندهد بهتر است با پزشک یا بیمارستانی که در آن نمونه برداری شده اید تماس بگیرید. ممکن است اثر خواب آلودگی داروهای مسکن برای چند ساعت در شما باشد. توصیه می شود در روز بیوپسی کبد رانندگی نکنید. در صورتی که احساس خواب آلودگی شدید دارید از حرکت به تنهایی و بدون همراه نیز اجتناب کنید و تا رسیدن به منزل در کنار همراه خود حرکت کنید.

✓ خونریزی از محل نمونه برداری معمولاً خیلی کم می باشد. خونریزی از ناحیه نمونه برداری بلافاصله باید به پرستار اطلاع داده شود.

خونریزی معمولاً در ساعات اولیه رخ می دهد. برای همین شما باید حداقل ۴ ساعت تحت نظر باشید. علامت ادامه

خونریزی افت فشارخون و افزایش ضربان قلب می باشد که در اینصورت شما باید برای مدت بیشتری در بیمارستان تحت نظر باشید.

✓ عوارض دیگر نمونه برداری مثل نشت صفرا به داخل شکم و سوراخ شدن کیسه صفرا یا روده می باشد.

✓ عفونت بسیار نادر می باشد و با درد و ناراحتی شدید شکم و تب و لرز مشخص می شود. در صورتیکه شما درد و ناراحتی بعد از نمونه برداری دارید به پرستار یا پزشک خود اطلاع دهید.

✓ چهار ساعت بعد از نمونه برداری می توانید پانسمان محل نمونه برداری را بردارید و ۲۴ ساعت بعد می توانید حمام کنید.

✓ روز بیوپسی را بیشتر استراحت کنید و از بلند کردن اجسام سنگین و فعالیت شدید تا یک هفته پرهیز نمائید

✓ شب بعد از نمونه برداری شام سبکی مثل سوپ بخورید.

✓ به مصرف داروی خاص یا آنتی بیوتیک احتیاج نیست.

✓ روز بعد از نمونه برداری می توانید غذای عادی مصرف کنید و فعالیت طبیعی و عادی داشته باشید.

در صورت بروز درد یا ناراحتی شدید شکم و سرگیجه و ضعف شدید یا تب به پزشک و پرستار خود اطلاع دهید.