

## پارگی پرده گوش:

پارگی پرده گوش عبارت است از پاره شدن پرده نازک گوش که قسمت های داخلی گوش را از گوش خارجی جدا می کند

## علایم شایع:

- \* درد ناگهانی در گوش

- \* ناشنوایی نسبی

- \* خونریزی یا ترشح از گوش. ترشح گوش ممکن

است در عرض ۲۴-۴۸ ساعت پس از پارگی ، شبیه چرک شود .

- \* وزوز گوش

- \* سرگیجه

## علل:

پاره شدن پرده گوش به دنبال وارد کردن یک شیء مثل گوش پاک کن یا گیره کاغذ برای تمیز کردن یا رفع خارش گوش . وارد آمدن فشار ناگهانی به پرده

گوش پاره شده عفونی شود، عفونت را می توان درمان کرد و شنوایی نیز معمولاً مشکل دائمی پیدا نمی کند .  
اگر پارگی خود به خود ترمیم نشود نیاز به جراحی وجود دارد.

## عواض احتمالی:

عفونت گوش همراه با تب، استفراغ و اسهال، ندرتاً خونریزی یامنژیست و ماسیتوئیدیت (عفونت ماسیتوئید: ناحیه استخوانی درست پشت گوش) و ندرتاً ناشنوایی دائمی.

تشخیص با معاینه گوش بوسیله اتوسکوپ (دستگاه مخصوص دیدن داخل گوش) تأیید می شود.



گوش به سمت داخل، مثلاً در اثر سیلی، حادثه به هنگام شنا یا شیرجه، یا وقوع انفجار در نزدیکی فرد. وارد آمدن فشار ناگهانی به پرده گوش به سمت خارج (مکش به سمت خارج) مثلاً در اثر بوسیدن گوش، عفونت گوش میانی.

## عوامل تشدید کننده بیماری :

- ❖ عفونت اخیر گوش میانی
- ❖ صدمه به سر

## پیشگیری:

هیچ شئی را درون مجرای گوش فرو نکنید.  
از صدماتی که ممکن است باعث پاره شدن پرده گوش شوند اجتناب کنید .

در صورت بروز عفونت گوش میانی، سریعاً برای درمان مراجعه کنید.

## عواقب مورد انتظار:

اگر پرده گوش پاره شده عفونی نشود، معمولاً خود به خود و در عرض ۳ ماه ترمیم صورت می گیرد. اگر پرده



Amiralam.tums.ac.ir

آموزش به بیمار

از پارگی پرده گوش چه می دانید؟



## درجه شرایطی باید به پزشک مراجعه نمود؟

❖ اگر شما عالیم پارگی پرده گوش را دارید،  
خصوصاً اگر ترشح چرک مانند از گوش خارج  
می شود .

❖ اگر یکی از موارد زیر هنگام درمان رخ دهد :

- تب
- دردی که علی‌رغم درمان ادامه یابد .
- سرگیجه‌ای که بیش از ۱۲-۲۴ ساعت طول بکشد .
- اگر دچار عالیم جدید و غیرقابل توجیه شده اید.
- داروهای مورد استفاده در درمان ممکن است عوارض جانبی به همراه داشته باشند.

## درمان:

درمان شامل دارو برای پیشگیری از عفونت و مراقبت حمایتی برای درد است. برای درد خفیف می‌توانید از استامینوفن استفاده کنید.

## مراقبت:

❖ حتی المقدور فین نکنید. اگر این کار ضرورت داشته باشد، آن را به ملایمت انجام دهید .

❖ باد در گوشها باتان نیندازید و عطسه خود را نگه ندارید.

❖ مجرای گوش را خشک نگه دارید. شنا نکنید، در هنگام دوش گرفتن برای حفاظت گوش از آب مجرای گوش را با پنبه چرب پوشانید و پس از استحمام با فاصله ای بوسیله سشوار خشک کنید.

❖ اگر پرده گوش خود به خود ترمیم نشود، عمل جراحی ظرفی برای ترمیم آن صورت خواهد گرفت.